ESPECIES NUEVAS Y OBSERVACIONES DIVERSAS SOBRE DERMAPTEROS Y ORTOPTEROS COLOMBIANOS

HERMANO APOLINAR MARIA
Profesor en el Instituto de La Salle, de Bogotá.

(Continuación)

FAMILIA DE LOS MANTIDOS

Choeradodis rhombicollis Lat.

La especie fue descrita por Latreille; el autor no dio indicaciones de localidad. Es un insecto que pertenece sobre todo a la fauna de la América Central.

El señor G. Palmer encontró esta forma en Los Mangos y La María (Cauca). La colección del Museo del Instituto de La Salle posee dos ejemplares, de Muzo el uno, y de Villavicencio el otro. Según informan, la especie está esparcida en muchas partes del territorio colombiano; es una forma rara de la fauna nacional.

El señor Hebard estudió los insectos procedentes del Cauca y los halló del todo semejantes a los ejemplares de Centro América; en un segundo memorial habla de un ejemplar macho, que recibió de Andagoya (Antioquia) y que había sido capturado por el señor A. Carriker.

Acontiothespis iriodes sp. nov.:

Dice el autor: Este diminuto insecto tiene relación con *A. cordillera Saus. y A. vitrea Saus et Zehnt.* Los machos de *vitrae* se distinguen de *iriodes* (machos) en que tienen las alas y los élitros más alargados: *iriodes* se diferencia de *cordillera* en la coloración de los órganos del vuelo.

La descripción completa se halla en el primer trabajo del señor Hebard (junio de 1919, pág. 130).

El tipo, un macho, fue cogido en la región de Santa Marta; es único y el autor lo conserva en su colección.

Tithronne roseipennis Saus:

La especie fue descrita en 1870 por Saussure, sobre una hembra de las Guayanas. El señor Hebard señala Pueblo Nuevo de Ocaña (Santander), Moutamela (Cauca), y la región del río Aguatal (Cauca), como puntos de captura de *roseipennis* en Colombia.

Stagmomantis tolteca Sauss.:

El autor (Mr. Hebard) hace acerca de la presente especie las siguientes observaciones: ulteriormente Saussure reconoce que la *tolteca* no debe considerarse sino como una forma más adornada de *St. carolina.* Más tarde, Scudde emite las mismas opiniones, pero admitiendo a *tolteca* como una forma geográfica de *carolina.*

Mantis dimidiata de Burmeister ha sido considerada por los autores, aunque erróneamente, como una forma más verde de *carolina* o de *tolteca.*

No existiendo en los países del sur el género *Stagmomantis,* es evidente que el nombre impuesto por Burmeister se aplica a una especie de otro género. Mientras se pueda estudiar detenidamente la forma *carolina,* preferimos mantener el nombre *tolteca* para los insectos de la región tropical (l. c. pág. 132).

Los puntos señalados en Colombia como habitados por *St. tolteca* son los siguientes: Santa Marta (Hebard); Cincinnati (Magdalena); San Antonio (Cauca); estos dos últimos hallazgos se deben al señor A. Carriker.

Macromantis ovalifolia Stoll.:

La presente especie representa la forma más grande de todo el grupo. Se conoce de las Guayanas, del Brasil y de Colombia. El señor G. Palmer encontró ejemplares de *M. ovalifolia* en Jiménez (Cauca) y Los Mangos (mismo Departamento). Los ejemplares procedentes de Colombia son los más desarrollados. El macho mide 101 mm. contra 91 de un ejemplar del Brasil y 97 de otro que procede de las Guayanas. La hembra de Los Mangos 113 mm., la de Jiménez 104, contra 98 de la de las Guayanas y 92 de la brasilera. (Hebard l. c., pág. 133).

Liturgusa mesopoda Westw.:

Especie descrita por Westwood sobre un ejemplar hembra, descubierto en Saint-Laurent de Maroni (Guayana francesa). El señor Palmer encontró, en marzo de 1907, un ejemplar en Jiménez (Cauca); en 1915 el señor A. Carriker encontró otro espécimen en la misma región.


Pseudomiopteryx bogotensis Sauss.:

Según el parecer del señor Hebard, las cuatro formas de este grupo, hasta hoy descritas, no representan, probablemente, sino razas locales de una misma especie.

En Colombia se ha encontrado *Ps. bogotensis* en Cincinnati (Magdalena), San Antonio y Jiménez (Cauca). En diciembre de 1917, el señor A. Carriker encontró otro ejemplar en Mamatoco (Magdalena).

Miopteryx granadensis Sauss.:

La presente especie se parece mucho a *M. Simoni*



MANTIDOS

No. 1 — THESPIS METAE HEB.
No. 2 — STAGMATOPTERA SEPTENTRIONALIS SAUS. ET Z. (MACHO)
No. 3 — STAGMATOPTERA SEPTENTRIONALIS SAUS. ET Z. (HEMBRA)
No. 4 — STAGMATOPTERA SEPTENTRIONALIS SAUS. ET Z. DE COLONIA (FLORENCIA)
No. 5 — PHYLLOVATES CHLOROPHAEA BL.
No. 6 — PHYLLOVATES CHLOROPHAEA BL.

No. 7 — CHOERADODIS RHOMBICOLLIS LAT.
No. 8 — CHOERADODIS SP.?
No. 9 — CALLIBIA DIANA STOLL.
No. 10 — ZOOLEA LOBIPES OLIV.
No. 11 — VATES FESTAE G. T.
No. 12 — CATOXYOPSIS DUBIOSA G. T.

Chop., de Venezuela. El único lugar conocido en Colombia como habitado por *M. granadensis* es Cincinnati (Magdalena).

Musonia surinama Sauss.:

Saussure describió la presente especie, en 1869, sobre un macho procedente de Surinam. El señor A. Carriker encontró dos machos y una hembra en Cincinnati.

Thespis metae sp. nov.:

La presente especie tiene mucha semejanza con *T. media G. T.;* el macho, único sexo conocido de la nueva forma, difiere del macho de *T. media* por sus menores dimensiones, cabeza más oscura y élitros más anchos.

El autor describió la especie sobre un ejemplar macho que el Museo de La Salle había recibido de Villavicencio. En la colección del Instituto se conservan otros dos ejemplares del mismo sexo y de la misma procedencia. Descripción: l. c. VIII—21, pág. 155.

Pseudomusonia lineativentris Stal.:

Especie descrita en 1877 sobre un ejemplar procedente de Colombia. En 1918 el señor Carriker cogió un macho joven de *Ps. lineativentris* en Andagoya (Antioquia).

Pogonogastes latens sp. nov.:

Especie descrita sobre un ejemplar conservado en el Museo de Washington y procedente del río Aguatal (Cauca). En su forma general difiere mucho de *P. Tristani Rehn.*, la especie más cercana.

Descripción: l. c., pág. 136.

Lobocneme colombiae sp. nov.:

Dice el autor: "Como en el genotipo, *L. lobipes Redt.*, la presente especie tiene la cabeza más ancha y la dilatación posterior del pronoto más pronunciada que las especies del género *Parastagmoptera* que tenemos a la vista. Las antenas están provistas de dientes serratiformes pero no tan bien marcados como son los de *lobipes.*

La posición genérica de la especie se reconoce fácilmente por la dilatación ventro-caudal del femur posterior.

Por el campo marginal de los élitros la nueva forma se parece mucho a *Parastagmoptera serricornis Kirby* y a *P. unipunctata Brm.*, pero se diferencia netamente de ambas formas por el estrechamiento brusco de dicho campo hacia atrás".

Un macho en la colección del señor Hebard, procedente de Santa Marta.

Descripción: l. c. VI—1919, pág. 138.

Carrikella gen. nov.

El nuevo género tiene relaciones con el género *Pogonogaster Rehn.; Carrikella* se distingue, sin embargo, fácilmente por la particularidad de tener un cuerno cilíndrico encima de las ocelas.

Descripción: l. c. VIII—1923, pág. 157.

Carrikella ceratophora sp. nov.:

La descripción que aparece en el mencionado trabajo del señor Hebard, pág. 159, se hizo sobre un ejemplar hembra cogido por el señor A. Carriker en Andagoya (Antioquia).

El insecto es muy notable por el cuerno bífido que le adorna la cabeza.

Callibia diana Stoll.:

La especie fue descrita en 1813 con el nombre de *Mantis diana;* representa una de las especies más raras de los mántidos americanos; sin embargo su dispersión es inmensa. Su presencia ha sido constatada en las Guayanas, en el Brasil (Ega y Pernambuco) y, finalmente, en Muzo, de donde recibimos dos ejemplares en febrero de 1919.

Stagmatoptera septentrionalis Saus. et Z.:

La especie se extiende desde Centro América hasta el Brasil central por lo menos. El señor Carriker encontró *St. septentrionalis* en Boca Murindó (Chocó) y en Andagoya (Antioquia).

La colección del Museo del Instituto cuenta con algunos ejemplares procedentes de Honda, Barranquilla, Fusagasugá y Colonia Florencia (Caquetá). De esta última procedencia tenemos un par; la hembra es notable por las manchas alargadas que aparecen en los élitros; tiene tres veces las dimensiones de las manchas que adornan los mismos órganos en los ejemplares ordinarios.

Saussure y Zehntner establecieron una variedad *Minor;* el señor Hebard estudiando detenidamente la tal denominación, concluye que no se trata sino de variaciones individuales que no pueden tener la importancia de una subespecie.

Phyllovates stolli Sauss. et Z.:

Especie descrita en 1894 sobre unos insectos procedentes del Brasil y de las Guayanas.

Tuvimos el gusto de remitir al señor Hebard un ejemplar hembra cogido en noviembre de 1919 en Choachí. El señor A. Carriker encontró la misma especie en Cincinatti (Magdalena).

Phyllovates chlorophaea Blanch.:

La especie parece esparcida sobre una gran porción de nuestro territorio. Tenemos ejemplares de Villavicencio, de Puerto Berrío, de Honda y de Fusagasugá.

(Continuará)